

# Acetato de medroxiprogesterona de depósito (Depo Provera®)

Esta hoja trata de la exposición al acetato de medroxiprogesterona de depósito en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no debe usarse como un sustituto de la atención médica o los consejos de su proveedor de atención de salud.

## **¿Qué es el acetato de medroxiprogesterona de depósito?**

El acetato de medroxiprogesterona de depósito es la forma inyectable (administrada mediante inyección) de una hormona sintética llamada acetato de medroxiprogesterona. Este medicamento es similar a la hormona progesterona. Se puede encontrar más información acerca de la progesterona en nuestra hoja informativa en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/progesterona/>. La medroxiprogesterona de depósito se comercializa bajo la marca Depo Provera®.

La inyección de acetato de medroxiprogesterona de depósito se usa para prevenir el embarazo (como método anticonceptivo). Esta funciona durante aproximadamente 90 días, pero el medicamento puede permanecer más tiempo en el torrente sanguíneo. Se recomienda que las mujeres reciban una inyección cada 90 días para prevenir el embarazo. El acetato de medroxiprogesterona de depósito no es lo mismo que las píldoras anticonceptivas orales (tomadas por boca), las cuales contienen otras hormonas.

Este medicamento también se puede usar para tratar algunos problemas del periodo de la persona (los trastornos menstruales) y, en dosis altas, se puede usar para tratar ciertos tipos de cáncer. Esta hoja informativa enfoca en el uso de la inyección de acetato de medroxiprogesterona de depósito como método anticonceptivo.

## ***Estoy tomando acetato de medroxiprogesterona de depósito, pero me gustaría dejar de tomarlo antes de quedar embarazada. ¿Cuánto tiempo permanece el medicamento en mi cuerpo?***

Las personas eliminan los medicamentos a diferentes velocidades. En adultos saludables, tarda entre 120 y 200 días para que la mayor parte del acetato de medroxiprogesterona de depósito se elimina del cuerpo.

## ***Tomo acetato de medroxiprogesterona de depósito. ¿Puede hacer que sea más difícil quedar embarazada?***

El acetato de medroxiprogesterona de depósito es un método anticonceptivo y se espera que reduzca la probabilidad de quedar embarazada.

## ***¿Tomar acetato de medroxiprogesterona de depósito aumenta la posibilidad de aborto espontáneo?***

El aborto espontáneo es común y puede ocurrir en cualquier embarazo por muchas razones diferentes. Basado en los estudios revisados, no se espera que el uso del acetato de medroxiprogesterona de depósito aumente la posibilidad de aborto espontáneo.

## ***¿Tomar acetato de medroxiprogesterona de depósito aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento?***

Cada embarazo comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un defecto de nacimiento. Esto se conoce como el riesgo de fondo. La mayoría de los estudios no han demostrado una mayor probabilidad de defectos de nacimiento debido a la exposición al acetato de medroxiprogesterona de depósito.

## ***¿Tomar acetato de medroxiprogesterona de depósito aumenta la probabilidad de otros problemas relacionados con el embarazo?***

No se han realizado estudios para ver si el acetato de medroxiprogesterona de depósito aumenta la probabilidad de problemas relacionados con el embarazo, como el parto prematuro (parto antes de la semana 37) o el bajo peso al nacer (que pesa menos de 5 libras, 8 onzas [2500 gramos] al nacer).

## ***¿Tomar acetato de medroxiprogesterona de depósito en el embarazo afecta el futuro comportamiento o***

### ***aprendizaje para el niño?***

Los estudios limitados no han observado problemas de salud a largo plazo debido a la exposición al acetato de medroxiprogesterona de depósito durante el embarazo.

### **La lactancia mientras tomar acetato de medroxiprogesterona de depósito:**

El acetato de medroxiprogesterona de depósito pasa a la leche en pequeñas cantidades. Las cantidades de hormona que se encuentran en la leche son pequeñas. Según los estudios revisados, no se espera que la medroxiprogesterona de depósito afecte negativamente el crecimiento y desarrollo a largo plazo de un niño. Algunas fuentes, como la Organización Mundial de la Salud y la etiqueta del producto, han recomendado esperar 6 semanas después del nacimiento del bebé antes de comenzar a tomar este medicamento. Asegúrese de hablar con su proveedor de atención de salud acerca de todas sus preguntas sobre el amamantamiento.

### ***Si un varón toma acetato de medroxiprogesterona de depósito, ¿podría afectar la fertilidad (capacidad para embarazar a su pareja) o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento?***

Se han realizado algunos estudios en los que a los varones se les administró acetato de medroxiprogesterona de depósito y otro medicamento para prevenir la espermatogénesis (el proceso del cuerpo de producir espermatozoides), lo que dificultaría concebir un embarazo. No se han realizado estudios para ver si el acetato de medroxiprogesterona de depósito podría aumentar la posibilidad de defectos de nacimiento por encima del riesgo de fondo. En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres o donantes de esperma aumenten los riesgos para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby acerca de Exposiciones Paternas en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/exposiciones-paternas/>.

**Por favor haga clic [aquí](#) para ver las referencias.**

**¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en [MotherToBaby.org](https://mothertobaby.org) .**

---

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). *OTIS/MotherToBaby fomenta el lenguaje inclusivo y centrado en la persona. Si bien nuestro nombre todavía contiene una referencia a las madres, estamos actualizando nuestros recursos con términos más inclusivos. El uso del término madre o materna se refiere a una persona que está embarazada. El uso del término padre o paterno se refiere a una persona que contribuye esperma.* Copyright de OTIS, enero 1, 2022.